



Komunikat sadowniczy SKS 21 2015-09-22

POZAKORZENIOWE NAWOŻENIE JABŁONI

W obecnym sezonie mogą wystąpić problemy z przechowaniem owoców – w niektórych sadach już można zaobserwować objawy gorzkiej plamistości podskórnej. W związku z tym wskazane jest aby zadbać o nawożenie owoców produktami wapniowymi: należy zastosować chlorek wapnia w dawce 12 kg/ha, dodając

Megafol w dawce 1 l/ha w celu zwiększenia efektywności zabiegu.

W przypadku obaw co do stosowania chlorku wapnia, należy stosować preparaty zawierające wapń skompleksowany aminokwasami, np.:

Amiwap w dawce 5-7,5 l/ha

W odmianach później zbieranych w celu poprawy wybarwienia owoców należy wykonać opryskiwanie produktami:

FruitAkademia na wzrost owoców II 8kg/ha (nawóz można łączyć z zabiegami fungicydowymi) oraz **Sweet** dwukrotnie co 7-10 dni w dawce 2-2,5 l/ha

CHOROBY PRZECHOWALNICZE

Odmiany przeznaczone do zbioru za co najmniej tydzień należy opryskać środkiem **Bellis 38 WG** w dawce 0,8 kg/ha, a na odmiany przeznaczone do zbioru w przeciągu tygodnia należy wykonać zabieg preparatem **Switch 62,5 WG** w dawce 0,75 kg/ha lub **Geoxe 50 WG** w dawce 0,45 kg/ha (dawkę dostosować do wielkości korony).

ZABIEGI POZBIORCZE

W okresie po zbiorczym w celu ograniczenia infekcji **chorobami zgorzelowymi** należy wykonać zabieg preparatem: **Topsin M 500 SC** w dawce 1,5 l/ha. Zabieg ten jest szczególnie ważny w przypadku odmian wrażliwych na choroby drewna i kory np.: Gala, Szampion. Opryskiwanie należy wykonać możliwie jak najszybciej po zbiorze owoców.

Czas po zbiorze owoców jest optymalnym dla dokarmienia roślin borem i cynkiem – pierwiastki te podnoszą odporność roślin na niskie temperatury oraz wzmacniają pąki kwiatowe. Nawożenie pozbiorcze sadów jest pierwszym zabiegiem mającym wpływ na jakość owoców na przyszły sezon, a bor jest również ważnym składnikiem pokarmowym w okresie kwitnienia i wiązania owoców.

Zalecamy zastosować gotową mieszankę cynku, boru oraz azotu w postaci nawozu:

FruitAkademia po zbiorach w dawce 7,5 kg/ha

UWAGA! Stosowanie wysokiej dawki mocznika powinno być wykonane tuż przed opadaniem liści i zabieg ten ma na celu szybszy rozkład liści przez mikroorganizmy glebowe. Nawożenie cynkiem i borem powinno być wykonane oddzielnie, odpowiednio wcześniej, aby umożliwić wspomnianym pierwiastkom wbudowanie się w trwałą tkankę. Nie należy łączyć tego zabiegu z mocznikiem w wysokiej dawce. Dodatek azotu w nawozie **FruitAkademia po zbiorach** poprawia przyswajanie składników i dokarmia pąki również azotem co zapewnia optymalny start w przyszłym sezonie.

PRZECHOWYWANIE JABŁEK

Długotrwałe przechowywanie jabłek pozwala uzyskać wyższe ceny za owoce. Podstawowym problemem jest utrzymanie wysokiej jakości owoców podczas długiego przechowywania. Polecamy stosowanie środka **FruitSmart** zawierającego 1-MCP. Substancja spowalnia dojrzewanie owoców. Niesie to ze sobą wiele dodatkowych korzyści, oprócz lepszych parametrów jakościowych po przechowywaniu ogranicza straty masy wynikające z transpiracji i oddychania oraz pozwala zaoszczędzić na zużyciu energii obiektów przechowalniczych. **FruitSmart** to pierwszy polski produkt zawierający 1-MCP, przeznaczony do samodzielnej aplikacji.

SKS 21 Przechowalnicze: Bellis 0,8kg/Geoxe 0,45kg. Wapn: Amiwap 5L/Chlorek 12kg+Megafol 1L; Wybarwienie: FA wzrost owoców II 8 kg/Sweet 2L; Pozbiorcze: Topsin 1,5L, FA_po_zbiorach 7,5kg. Przechowywanie jabłek: aplikacja FruitSmart
http://zzowarka.pl/download/SKS_21_2015.pdf