



Komunikat sadowniczy SKS 2 2016-03-24

PARCH JABŁONI

Z obserwacji zarodników workowych parcha jabłoni wynika, że nie są one jeszcze gotowe do wysiewu. Zapowiadane ocieplenie w okresie świąt może zmienić tę sytuację. Jeśli do tego czasu otworzą się pąki i pokaże się zielona tkanka wskazane będzie wykonanie zabiegu zapobiegawczego przed spodziewanym deszczem. Do tego celu zalecamy zastosowanie preparatu miedziowego:

Copper Max NEW 50 WP lub Miedzian 50 WP, w dawce 1,5 kg/ha.

CHOROBY KORY I DREWNA

Sady po formowaniu koron, zagrożone chorobami kory i drewna, należy zabezpieczyć preparatem **Topsin M 500 SC** w dawce 1,5 l/ha.

ZWALCZANIE RAKA BAKTERYJNEGO DRZEW PESTKOWYCH

W okresie nabrzmiewania pąków drzew pestkowych należy wykonać zabieg przeciwko rakowi bakteryjnemu stosując jeden z produktów miedziowych, np.: **Copper Max NEW 50 WP** w dawce 1,5-2 kg/ha.

MIODÓWKA GRUSZOWA

Kiedy temperatura w ciągu dwóch kolejnych dni osiągnie około 12-15°C dorosłe osobniki miodówek na gruszech rozpoczynają swoją aktywność. W takich warunkach sadownicy na zachodzie rozpoczynają zwalczanie. Pierwsze dwa zabiegi bazują na olejach mineralnych:

- pierwszy: 10 l/ha oleju + 5 kg/ha siarki zanim pojawią się pierwsze zielone tkanki.
- drugi zabieg gdy pojawią się zielone tkanki: 10 l/ha oleju mineralnego z dodatkiem pyretroidu

Ważne jest aby rośliny były możliwie jak najdokładniej pokryte cieczą roboczą.

KWIECIAK JABŁKOWIEC

W sadach gdzie szkodnik stanowił problem w poprzednim sezonie należy wykonać lustrację na jego obecność. Kwieciek jest aktywny w temperaturze powyżej 15°C i w takich warunkach należy przeprowadzić lustracje oraz ewentualne zwalczanie jednym z zarejestrowanych pyretroidów.

SKS 1 Parch jabłoni: Copper Max 1,5 kg; Choroby kory i drewna: Topsin 1,5 l; Rak Bakteryjny Pestkowych: Copper Max NEW 2 kg; Miodówka gruszoza: pyretroid; Kwieciek jabłkowiec: pyretroid
http://zzowarka.pl/download/SKS_2_2016.pdf