



Komunikat sadowniczy SKS 3 2016-04-01

PARCH JABŁONI

Po ostatnich opadach w niektórych lokalizacjach mogło dojść do niewielkich wysiewów zarodników parcha jabłoni. Zatem w sadach, gdzie pąki są już otwarte i przed deszczem nie wykonano zabiegu zapobiegawczego fungicydem miedziowym, mogło dojść do pierwszych infekcji. W takim przypadku zaleca się zabieg fungicydem Syllit 65 WP w dawce 1 kg/ha lub **Batalion 450 SC** w dawce 0,7-1 l/ha. Przed kolejnymi opadami zalecamy zabieg zapobiegawczy fungicydem miedziowym:

Copper Max NEW 50 WP lub Miedzian 50 WP, w dawce 1,5 kg/ha.

ZWALCZANIE PRZĘDZIORKÓW I MSZYC

W sadach w których stwierdzono obecność zimujących jaj przędziorków należy wykonać zabieg środkiem **Treol 770 EC** w dawce 1,5%, co odpowiada 10-15 l/ha.

Zabiegi olejem mineralnym wykonane wczesną wiosną ograniczają również liczebność mszyc. Zabieg wykonany w terminie najpóźniej do fazy mysiego ucha niesie ze sobą dużą skuteczność.

Zabieg ten nie zwalcza przędziorka chmielowca.

Opóźnienie terminu zabiegu podnosi skuteczność, ale niesie ze sobą ryzyko fitotoksyczności na liściach.

NAWOŻENIE POZAKORZENIOWE

Nawóz **FruitAkademia na początek wegetacji** w sadach gdzie widoczne są zielone tkanki należy zastosować w niższej dawce: do 5-7 kg/ha (standardowa dawka to 11 kg/ha). Wysoka zawartość potasu przyspieszy regenerację wiązek przewodzących po zimie.

Nawóz **FruitAkademia na mysie ucho** należy stosować gdy większość pąków szczytowych będzie w fazie mysiego ucha. Jest to mieszanka bogata w azot i mikroelementy, cynk i bor, bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju liści i formowania kwiatów.

NAWOŻENIE DOGLEBOWE KWASAMI HUMUSOWYMI

Stosowanie preparatów humusowych wpływa na zwiększenie w glebie zawartości substancji organicznych. Polecamy wykonać zabieg szczególnie w sadach/na plantacjach, na których zawartość substancji organicznej w glebie jest niska. Zalecamy stosować płynne kwasy humusowe np. **Humistar** w dawce 20 l/ha. Dobrze jest wykonać aplikację tuż przed lub w trakcie opadów, za pomocą belki herbicydowej.

SKS 3 2016 Parch: Zapobiegawczo: Copper Max NEW 1,5kg; Interwencyjnie: Batalion 0,7L; Przędziorki/mszyce: Treol 1,5%; Dolistnie: FruitAkademia początek wegetacji/FruitAkademia mysie ucho, Doglebowo: Humistar 20L.
http://zzowarka.pl/download/SKS_3_2016.pdf