



Komunikat sadowniczy SKS 8 2016-05-10

PARCZ JABŁONI

Opady deszczu, które miały miejsce w weekend doprowadziły do znaczących wysiewów zarodników workowych. Spowodowały one lokalnie występujące infekcje o średniej sile. Na kolejne dni również zapowiadane są lokalnie występujące opady deszczu a nawet burze.

Tam gdzie infekcje miały miejsce zasadny jest zabieg interwencyjny preparatami z grupy anilinopirymidyn np. **Batalion 450 SC (1 l/ha)** lub Mythos 300 SC (1,5 l/ha) lub zawierającymi difenokonazol np. **Aplord 250 EC (0,2 l/ha)** lub Score 250 EC (0,2 l/ha). Preparaty interwencyjne należy stosować zawsze łącznie z fungicydem kontaktowym, np. **Delan 700 WG (0,5 kg/ha)** lub **Scab 80 WG (1,88 kg/ha)**. Można zastosować gotowe mieszaniny np. Flint Plus 64 WG (1,85 kg/ha) lub Tercel 16 WG (2,0 kg/ha).

W pozostałych przypadkach przed spodziewanym deszczem zalecamy zabieg zapobiegawczy np. preparatem **Scab 80 WG (1,88 kg/ha)** łącznie z preparatem wspomagającym ochronę, np. **Kendal 2,0 l/ha** lub **Prevent P 2,0 l/ha**.

Przypominamy, że odpowiednie postępowanie w sytuacjach silnych infekcji (odpowiedni schemat zabiegów i dobór preparatów) decyduje o sukcesie w walce z parczem jabłoni.

MACZNIAK JABŁONI

Aktualne warunki pogodowe są optymalne dla rozwoju maczniaka jabłoni. Zalecamy wykonanie zabiegu ograniczającego rozwój choroby jednym z preparatów:

Kendo 50 EW, Kaptan Plus 71,5 WP, Fontelis 200SC, Topas 100 EC, Zato 50 WG,

NAWOŻENIE DOLISTNE

W sadach w których występują problemy z jakością liści zalecany jest zabieg stosując mieszaninę produktu aminokwasowego oraz nawozu mikroelementowego bogatego w magnez. Zalecamy preparaty: **Megafol 2 l/ha + OptiMikro 2,5 kg/ha**. Zabieg należy powtórzyć po 7-10 dniach.

MIODÓWKA GRUSZOWA

Jeśli lustracja w sadzie wykaże dużą liczebność larw, po kwitnieniu zalecany jest zabieg jednym z preparatów: **Apacz 50 WG 0,15 kg/ha**, Acaramik 018 EC 0,75 l/ha lub Movento 100 SC 2,25 l/ha.

TRUSKAWKA

Truskawka wchodzi w fazę kwitnienia. Należy rozpocząć zwalczanie szarej pleśni. Zalecamy wykonanie zabiegu jednym z preparatów: **Mythos 300 SC (2,5 l/ha)**, **Luna Sensation 500 SC (0,8 l/ha)**, Frupica 440 SC (0,7 l/ha) lub Signum 33 WG (1,8 kg/ha).

SKS 8 2016 Parcz: zapobiegawczo Delan 0,5kg+Kendal 2L; interwencyjnie Batalion 0,7 L /Aplord 0,2L + Scab 1,88kg
Macznik: Kendo 0,4kg Dolistnie: Megafol 2L + OptiMicro 2,5 kg; Miodówka: Apacz 0,15 kg Truskawka: szara plesn
Mythos 2,5L
http://zzowarka.pl/download/SKS_8_2016.pdf