

System Komunikatów Sadowniczych – SKS – zalecenia agrotechniczne i ochrony roślin opracowane przez Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka Sp. z o.o., w oparciu o program doradczy **FRUIT AKADEMIA**. System SKS realizowany jest przy współudziale władz samorządowych gmin: **Bełsk Duży, Błędów, Goszczyn, Góra Kalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowiec, Tarczyn, Warka, Wilga**.



## Komunikat sadowniczy SKS XIX 2013-07-23

### **OWOCÓWKA ŚLIWKÓWECZKA**

Rozpoczął się lot motyli drugiego pokolenia owocówki śliwkóweczki. Jest ono liczniejsze i bardziej płodne od pierwszego, dlatego konieczne jest wykonanie zabiegu zwalczającego jednym z wymienionych preparatów:

<b>Calypso</b>	<b>0,2 l/ha</b>
<b>Dimilin</b>	<b>0,4 l/ha</b>
<b>Mospilan</b>	<b>0,2 kg/ha</b>
<b>SpinTor</b>	<b>0,6-0,8 l/ha</b>
<b>Runner</b>	<b>0,5 l/ha</b>

W kwaterach odmian późno dojrzewających konieczne będzie powtórzenie zabiegu za 2 tygodnie.

### **ZWÓJKÓWKI LIŚCIOWE**

W wielu sadach stwierdzono obecność zwójekówek, aby uniknąć uszkodzenia owoców konieczne jest opryskanie drzew. W przypadku stwierdzenia występowania szkodnika należy zastosować jeden z poniższych preparatów:

<b>Coragen</b>	<b>0,175 l/ha</b>
<b>Runner</b>	<b>0,5 l/ha</b>
<b>Steward</b>	<b>0,17 kg/ha</b>
<b>Affirm</b>	<b>2,5-3 kg/ha</b>
<b>Reldan</b>	<b>2,7 l/ha</b>

### **NEKROTYCZNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI U GOLDENA**

W ostatnich dniach nasilają się objawy nekrotycznej plamistości liści w wielu nasadzeniach odm. Golden Delicious. Aby ograniczyć opadanie liści konieczne jest wykonanie dodatkowych aplikacji dolistnych magnezem z mikroelementami, stosując jeden z nawozów:

<b>Optimikro</b> (magnez i mikroelementy)	w dawce 5 kg/ha
<b>Magnitech</b> (magnez i mikroelementy)	w dawce 4 l/ha
<b>Siarczan magnezu</b>	w dawce 5 kg/ha.

Wskazane jest wykonanie dwóch zabiegów co 7 dni.

W poprzednim sezonie stwierdzono, że część preparatów biostymulujących opartych o wyciągi roślinne (np. **Sweet**) ograniczało zjawisko opadania liści na odmianach podatnych na to zjawisko.

### **DROBNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI DRZEW PESTKOWYCH**

Po zbiorach czereśni i wiśni w kwaterach, na których występują objawy drobnej plamistości liści, wskazany jest zabieg jednym z preparatów zawierających dodynę: (Carpene, Syllit)