

System Komunikatów Sadowniczych – SKS –zalecenia agrotechniczne i ochrony roślin opracowane przez Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka Sp. z o.o., w oparciu o program doradczy **FRUIT AKADEMIA**. System SKS realizowany jest przy współudziale władz samorządowych gmin: **Bełsk Duży, Błędów, Goszczyn, Góra Kalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowiec, Tarczyn, Warka, Wilga.**



Komunikat sadowniczy SKS XVII 2012-08-02

PARCZ JABŁONI

Należy kontynuować zabiegi zapobiegawcze w odstępach co 10-14 dni, stosując jeden z preparatów: Kaptan 50 WP, Captan 80 WG, Delan 700 WG, Ventop 350 SC, Dithane Neo Tec 75 EG, Indofil 80 WP, Thiram Granuflo 80 WG, Sadoplone 75 WP, Pomarsol Forte 80 WG, Antracol 70 WG. W sytuacji kiedy na liściach występują aktywne plamy parcha zabiegi należy wykonywać co 7 dni.

CIECIE LETNIE

Najlepszym momentem na rozpoczęcie cięcia letniego jest okres od czwartego do drugiego tygodnia przed terminem przewidywanego zbioru. Cięcie rozpoczęte zbyt wcześnie może spowodować ograniczenie przyrastania owoców, opóźnione cięcie nie wpłynie na wybarwienie owoców w znaczący sposób. Owoce najlepiej wybarwione uzyskuje się przy połączeniu metod cięcia letniego oraz nawożenia preparatami zawierającymi w swoim składzie potas oraz fosfor, np.

FruitAkademia na wzrost owoców II

PRZĘDZIORKI

Specyfiką tego roku są utrzymujące się okresy wysokich temperatur. Takie warunki sprzyjają szybkiemu przyrostowi populacji przędziorków. W tym sezonie w części sadów pomimo wykonania już 2-3 zabiegów nadal występują ogromne problemy z przędziorkami. W wielu sadach dostrzec można również pordzewiacze. Obecnie w sadach występują wszystkie stadia rozwojowe przędziorków i należy liczyć się z tym, że aby skutecznie zwalczyć całą populację należy wykonać zabieg dwoma akarycydami:

jednym z preparatów zwalczającym formy ruchome:

Omite 570 EW w dawce 2 l/ha,

Ortus 05 SC w dawce 1 l/ha,

drugim preparatem zwalczającym jaja przędziorków:

Zoom w dawce 0,45 l/ha,

Nissorun 050 EC w dawce 0,9 l/ha,

Preparat Omite nie występuje już w sprzedaży, ale osoby, które kupiły go wcześniej, nadal mogą go legalnie stosować do końca bieżącego roku.

W sytuacji, gdy w sadzie występują tylko pordzewiacze, polecamy zastosować:

Envidor 240 SC w dawce 0,4 l/ha,

Omite 570 EW w dawce 2 l/ha

lub **Ortus 05 SC w dawce 1,5 l/ha.**

Stosując akarycydy należy zwrócić uwagę na staranne pokrycie roślin cieczą roboczą. Polecamy również do akarycydów dodawać adiuwanty np. preparaty:

Partner lub Asystent.

KONTYNUUJEMY NAWOŻENIE WAPNIEM

W sytuacji kiedy występują wysokie temperatury w ciągu dnia przez 2-3 dni po wykonaniu zabiegu, stosowanie produktów wapniowych w formie saletry wapniowej lub chlorku wapnia staje się niebezpieczne. Nawet stosowane w niskich dawkach mogą powodować uszkodzenia owoców. W związku z tym w czasie upałów zalecamy stosować produkty formułowane np.:

Amiwap w dawce 2,5 l/ha, który jest bezpieczny nawet w wysokich temperaturach.