



## **Komunikat sadowniczy SKS XXV 2014-10-20**

### **CHOROBY ZGORZELOWE**

W okresie pozbiorczym w celu ograniczenia infekcji chorobami zgorzelowymi należy wykonać zabieg preparatem:

**Topsin M 500 SC** w dawce 1,5 l ha.

Opryskiwanie należy wykonać możliwie jak najszybciej po zbiorze owoców. Szczególnie ważne jest, aby oprysk wykonać na kwaterach podatnych na choroby kory i drewna (np. Gala, Sampion), na których zabieg pozbiorczy nie został jeszcze wykonany.

### **NAWOŻENIE DOLISTNE BOREM ORAZ CYNKIEM**

Czas po zbiorze owoców jest optymalnym dla dokarmienia roślin borem i cynkiem, pierwiastki te podnoszą odporność roślin na niskie temperatury oraz wzmacniają pąki kwiatowe. Nawożenie pozbiorcze sadów jest pierwszym zabiegiem mającym wpływ na jakość owoców na przyszły sezon, a bor jest również ważnym składnikiem pokarmowym w okresie kwitnienia i wiązania owoców.

Chcąc by składniki pokarmowe z dolistnych nawozów zawierających cynk i bor (tzw. pozbiorczych) zostały wchłonięte w odpowiedniej ilości należy je zastosować możliwie jak najszybciej. Dlatego też, preparaty bogate w bor oraz cynk stosuje się przed okresem zimowym (w okresie pomiędzy zakończeniem zbiorów owoców a początkiem opadania liści).

Zalecamy zastosować gotową mieszankę cynku, boru oraz azotu w postaci nawozu:

**FruitAkademia po zbiorach – w dawce 7,5 kg/ha**

### **POZBIORCZE ZWALCZANIE PARCHA JABŁONI**

Aby ograniczyć pierwotne źródło infekcji, jakim są zarodniki workowe, należy wykonać jesienne opryskiwanie sadów 4-5% (40-50 kg /ha) roztworem mocznika na początku opadania liści.

Zaleca się również rozdrobnienie opadłych liści kosiarką bijakową. Liście rozdrobnione są o wiele szybciej rozkładane przez organizmy glebowe. Najlepiej zabieg taki wykonać co najmniej dwukrotnie w ciepły dzień po przymrozku (uzyskuje się najlepszy efekt rozdrabniania).